YaraTera™ fertygacja czereśni

przykład dla sadu z obsadą
około 1000 szt./ha,
odmiany późno dojrzewające

Faza		Dawka nawozu na 1 ha/tydzień podawana przez zbiornik: A	B
kwitnienie			**KRISTALON Żółty** 9-12 kg* + **KRISTA MgS** 5 kg
od końca kwitnienia przez około 4 tygodnie		**CALCINIT** 10-15 kg*	**KRISTALON Niebieski** 9-12 kg + **KRISTA MgS** 5 kg
po około 4 tygod-niach od kwitnienia do zbiorów		**CALCINIT** 6-8 kg	**KRISTALON Biały** **10**-15 kg + **KRISTA MgS** 5 kg
po zbiorach**, przez około 4 tygodnie			**KRISTALON Czerwony** **8**-10 kg

* Niższe dawki – dla drzew na podkładkach silnie rosnących (Siewka Czereśni Ptasiej, Colt, F 12/1), wyższe dawki – dla drzew na podkładkach słabo rosnących (Gisela, PHL) oraz wstawkach skarlających

** po zakończeniu wzrostu pędów jednorocznych

» Wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).

» Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.

» Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila COMPLEX oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.



Nawozy Yara do nawożenia czereśni

YaraMila COMPLEX 12N+11P_2O_5+18K_2O+3MgO+20SO_3+mikro – bezchlorkowy, granulowany nawóz posypowy z aktywną formą fosforu, regenerującą system korzeniowy

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K_2O+12CaO – granulowana, posypowa saletra potasowo-wapniowa. Ułatwia dostosowanie nawożenia do spodziewanych plonów i przebiegu pogody

YaraLiva (granulowane posypowe saletry wapniowe wzmacniające naturalną odporność roślin, system korzeniowy oraz trwałość pozbiorczą plonów)
NITRABOR 15,4N+25,6CaO+0,3B – posypowa saletra z borem
TROPICOTE 15,5N+26,3CaO – posypowa saletra wapniowa

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności działania)
BORTRAC 150 g B w 1 litrze – dolistny nawóz borowy
CYNK F 700 g Zn w 1 litrze – dolistny nawóz cynkowy
FRUTREL 69 g N + 240 g P_2O_5 + 280 g CaO + 98 g MgO + 40 g Zn + 20 g B w 1 litrze – zawiesinowy nawóz z wysoką zawartością wapnia i fosforu, o przedłużonym działaniu, z dodatkiem koncentratu z alg morskich
STOPIT 224 g CaO w 1 litrze – skoncentrowany nawóz wapniowy, zawierający chlorek wapnia w najczystszej chemicznej postaci

KristaLeaf (seria nawozów dolistnych na trudne okresy wzrostu)
FRUIT CONTROLLER 5N+18P_2O_5+6MgO+12SO_3+3,4B+4Zn +0,03Mo – do stosowania około kwitnienia; poprawia wiązanie owoców
FOTO 14,2N+1,5P_2O_5+7K_2O+14MgO+27SO_3+1,5Fe(stabilny chelat) +0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem, regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)
CALCINIT 15,5N+26,5CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków; wzmacnia naturalną odporność roślin i system korzeniowy, poprawia jędrność i trwałość pozbiorczą plonów
KRISTALON (seria nawozów do fertygacji lub dokarmiania dolistnego)
Zielony 18N+18P_2O_5+18K_2O+mikro
Żółty 13N+40P_2O_5+13K_2O+mikro
Pomarańczowy 6N+12P_2O_5+36K_2O+mikro
Niebieski 19N+6P_2O_5+20K_2O+mikro
Biały 15N+5P_2O_5+30K_2O+mikro
Czerwony 12N+12P_2O_5+36K_2O+mikro
KRISTA MgS 16MgO+32SO_3 – w pełni rozpuszczalny siarczan magnezu do fertygacji oraz dokarmiania dolistnego

Dodatkowe informacje dostępne na stronie **www.yara.pl** oraz u przedstawicieli firmy: **Wojciech Kopeć** 695 331 511, **Sebastian Przedzienkowski** 695 111 945, **Hubert Tabor** 605 545 212, **Michał Wojcieszek** 691 115 420, **Wojciech Wojcieszek** 601 935 362, **Klaudia Zamkowska** 603 631 947.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl

© IV 2022

YARA

Knowledge grows

Nawożenie czereśni

Posypowe, dolistne, fertygacja

Produkuj ze smakiem!

dolistnie | posypowo | fertygacja



Knowledge grows

Kompleksowy program mineralnego nawożenia czereśni

		początek wegetacji	widoczne pojedyncze pąki kwiatowe	początek kwitnienia	pełnia kwitnienia	koniec kwitnienia/ /po kwitnieniu	wzrost owoców	dojrzewanie owoców	dojrzałość zbiorcza i zbiór	po zbiorach
YaraVita™	DOLISTNIE		CYNK F 1 l/ha			FRUTREL 3 l/ha 5-7 dni po Fruit Controller		STOPIT**** 5 l/ha		BORTRAC 2 l/ha wraz z CYNK F 1 l/ha
YaraTera™	DOLISTNIE						CALCINIT 5 kg/ha co 7-10 dni			wraz z KRISTALON Zielony 3 kg/ha
YaraTera™	DOLISTNIE						KRISTALON Pomarańczowy 3 kg/ha co 7-10 dni, na przemian z Calcinitem			1x 7 dni po zbiorach
KristaLeaf™	DOLISTNIE			FRUIT CONTROLLER 3 kg/ha	FRUIT CONTROLLER 3 kg/ha		KristaLeaf FOTO 3 kg/ha			KristaLeaf FOTO 3 kg/ha, 1x około 2 tyg. po zbiorach
Okres										
YaraMila™	DOGLEBOWO	COMPLEX 200 kg/ha*								
Unika™	DOGLEBOWO				UNIKA CALCIUM lub NITRABOR** 150 kg/ha	UNIKA CALCIUM 150 kg/ha				UNIKA CALCIUM*** 200 kg/ha
YaraLiva™	DOGLEBOWO				UNIKA CALCIUM lub NITRABOR** 150 kg/ha					

* średnia dawka: 200 g/drzewo, dawka 200 kg/ha odnosi się do obsady 1000 drzew/ha, wszystkie dawki nawozów posypowych stosujemy równomiernie w rzędy drzew na powierzchni pasów herbicydowych.

** UNIKA CALCIUM jest nawozem szczególnie przydatnym na glebach lekkich, przepuszczalnych oraz ubogich w potas; NITRABOR stosujemy na glebach lekkich, ubogich w bor. W przypadku wysokiej zasobności stanowiska w potas i bor stosujemy w tym terminie, zamiast tych nawozów, YaraLiva TROPICOTE, w takiej samej dawce.

*** po zakończeniu wzrostu pędów jednorocznych (przełom sierpnia/września); zabieg szczególnie wskazany przy obfitym owocowaniu w danym roku oraz w warunkach wymycia składników pokarmowych.

**** STOPIT stosujemy zamiast CALCINITU przy bardzo wysokiej zasobności gleby w azot oraz w warunkach jej wysokiej wilgotności.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji.
Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami więdnięcia.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara.
Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.