

YaraTera™

fertygacja jagody kamczackiej

przykład dla plantacji z obsadą
około 4000-5000 szt./ha



Knowledge grows

Nawożenie i biostymulacja jagody kamczackiej

Posypowe
Doliste
Fertygacja

Faza		Dawka nawozu na 1 ha/tydzień podawana przez zbiornik:	
		A	B
kwitnienie		CALCINIT 10 kg	KRISTALON Niebieski 12 kg
po kwitnieniu do zbiorów		CALCINIT 10 kg	KRISTALON Czerwony 15 kg
koniec zbioru i około 4 tygodnie po nim		CALCINIT 8 kg	KRISTALON Czerwony 8 kg

Nawozy Yara do nawożenia upraw jagody kamczackiej

YaraMila COMPLEX 12N+11P₂O₅+18K₂O+3MgO+20SO₃+mikro
– bezchlorkowy, granulowany nawóz posypowy z aktywną formą fosforu,
regenerującą system korzeniowy

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K₂O+12CaO – granulowana, posypowa
saletra potasowo-wapniowa. Ułatwia dostosowanie nawożenia do
spodziewanych plonów i przebiegu pogody

YaraLiva (granulowane posypowe saletry wapniowe wzmacniające
naturalną odporność roślin, system korzeniowy oraz trwałość pozbiorniczą
plonów)

NITRABOR 15,4N+25,6CaO+0,3B – posypowa saletra z borem
TROPICOTE 15,5N+26,3CaO – posypowa saletra wapniowa

YaraAmplix (specjalistyczne nawozy dolistne i biostymulatory)
OPTIVI biostymulator peptydowo-aminokwasowy do oprysków dolistnych
oraz fertygacji. Wydłuża okres kwitnienia, polepsza żywotność zalążków
i pytku kwiatowego. Zwiększa pobieranie i wykorzystanie azotu, żelaza,
wapnia

FLOSTREL 100g P₂O₅+100g B w 1 litrze + ekstrakt z alg morskich
– płynny nawóz do oprysków dolistnych w okresie kwitnienia
i zawiązywania owoców, dostarczający energii, redukujący stresy
abiotyczne, poprawiający jakość oraz wielkość plonu

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności
działania)

FRUTREL 69g N+240g P₂O₅+280g CaO+98g MgO+40g Zn+20g B
w 1 litrze – zawiesinowy nawóz z wysoką zawartością wapnia i fosforu,
o przedłużonym działaniu, z dodatkiem koncentratu z alg morskich

KristaLeaf (nawóz dolistny na trudne okresy wzrostu)

FOTO 14,2N+1,5P₂O₅+7K₂O+14MgO+27SO₃+1,5Fe(stabilny chelat)
+0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem,
regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)

CALCINIT 15,5N+26,5CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków;
wzmacnia naturalną odporność roślin i system korzeniowy, poprawia
jędrność i trwałość pozbiorniczą plonów

KRISTALON (seria nawozów do fertygacji lub dokarmiania dolistnego)

Pomarańczowy 6N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Niebieski 19N+6P₂O₅+20K₂O+mikro

Czerwony 12N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Super 12-12-36 (Gena) 12N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Super 17-6-25 (Vega) 17N+6P₂O₅+25K₂O+mikro

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz

u przedstawicieli firmy: **Piotr Dutkowski** 695 331 511,

Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, **Agata Kawecka** 605 545 212,

Michał Wojcieszek 691 115 420, **Klaudia Zamkowska** 603 631 947,

Magdalena Cieślak-Włodarczyk 601 935 362.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl

© I 2026

- » Wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).
- » Na glebach z wysokim pH i z wysoką zawartością magnezu stosować KRISTALON Super 17-6-25 (Vega) zamiast KRISTALONU Niebieskiego oraz KRISTALON Super 12-12-36 (Gena) zamiast KRISTALONU Czerwonego.
- » Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.
- » Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila COMPLEX oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.

Produkuj ze smakiem!



Knowledge grows

dolistnie

posypowo

fertygacja

Kompleksowy program mineralnego nawożenia i biostymulacji jagody kamczackiej



YaraAmplix™		FLOSTREL 2 l/ha	FLOSTREL 2 l/ha + OPTIVI 3 l/ha	OPTIVI 3 l/ha		
YaraVita™	D O L I S T N I E		FRUTREL 3 l/ha** 7 dni po Flostrel			
YaraTera™				CALCINIT 5 kg/ha co 5-7 dni		
YaraTera™				KRISTALON Pomarańczowy 3 kg/ha co 5-7 dni na przemian z Calcinitem		
KristaLeaf™						KristaLeaf FOTO 3 kg/ha 7, 14 i 21 dni po zbiorach
Okres						
		po ruszeniu wegetacji	początek kwitnienia	koniec kwitnienia	od zawiązywania owoców do dojrzewania	zbiór
YaraMila™	D O G L E B O W O	COMPLEX 200 kg/ha*				
Unika™				UNIKA CALCIUM 200 kg/ha		
YaraLiva™						NITRABOR 150 kg/ha do 2 tyg. po zbiorach

* dawki odnoszą się do obsady ok. 4000-5000 roślin/ha, nawozy posypowe stosujemy równomiernie w pasy herbicydowe wzdłuż rzędów.

** zabieg można łączyć z YaraAmplix OPTIVI.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji. Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami wędnięcia.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.