

YaraTera™ fertygacja cebuli



Knowledge grows

Nawożenie cebuli Posypowe Dolistne Fertygacja

Kolejny tydzień po 3-4 liściu właściwym	Dawka nawozu na 1 ha/tydzień podawana przez zbiornik:	
	A	B
1. tydzień		KRISTALON Niebieski 25 kg
2. tydzień	CALCINIT 25 kg	KRISTALON Czerwony 25 kg
3. tydzień		KRISTALON Niebieski 25 kg KRISTALON Czerw. 25 kg
4. tydzień	CALCINIT 25 kg	KRISTALON Czerwony 25 kg
5. tydzień	CALCINIT 25 kg	KRISTALON Czerwony 25 kg
6. tydzień		KRISTALON Czerwony 25 kg
7. tydzień		KRISTALON Czerwony 25 kg

Nawozy Yara do nawożenia cebuli

YaraMila COMPLEX 12N+11P₂O₅+18K₂O+3MgO+20SO₃+mikro – bezchlorkowy wieloskładnikowy nawóz granulowany; unikalna forma fosforu zawarta w nawozie stymuluje szybki rozwój korzeni roślin gwarantując lepsze pobieranie i wykorzystanie składników pokarmowych oraz wody

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K₂O+12CaO – granulowana saletra potasowo-wapniowa do nawożenia posypowego; unikalne połączenie trzech makroskładników w doskonale przyswajalnych formach; działanie plonotwórcze i poprawiające jakość warzyw

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności działania)

BRASSITREL PRO 69 g N + 125 g CaO + 118 g MgO + 60 g B + 70 g Mn + 4 g Mo w 1 litrze nawozu – odpowiednia kompozycja składników pokarmowych z dodatkiem substancji poprawiających skuteczność działania i ułatwiających stosowanie; dedykowany dla warzyw o zwiększonym zapotrzebowaniu na bor, mangan i molibden

MANGAN F 500 g Mn w 1 litrze – płynny koncentrat o wysokiej zawartości manganu

MIEDŹ 500 g Cu w 1 litrze – płynny koncentrat o wysokiej zawartości miedzi

KristaLeaf (seria nawozów dolistnych na trudne okresy wzrostu)

FOTO 14,2N+1,5P₂O₅+7K₂O+14MgO+27SO₃+1,5Fe(stabilny chelat) +0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem, regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)

CALCINIT 15,5N+26CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków; wzmacnia naturalną odporność roślin i system korzeniowy, poprawia jędrność i trwałość pozbiorną plonów

KRISTALON (seria wieloskładnikowych, krystalicznych, w pełni rozpuszczalnych nawozów do fertygacji i stosowania dolistnego)

Czerwony 12N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Pomarańczowy 6N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Zielony 18N+18P₂O₅+18K₂O+mikro

Niebieski 19N+6P₂O₅+20K₂O+mikro

Superba Mikromix 0,9B+1,0Zn(EDTA)+4,2Mn(EDTA)

+0,34Cu(EDTA)+0,08Mo+6,7Fe(EDTA+DTPA) – rozpuszczalny nawóz o wysokiej zawartości schelatowanych mikroelementów

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz

u przedstawicieli firmy: **Wojciech Kopeć** 695 331 511,

Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, **Hubert Tabor** 605 545 212,

Michał Wojcieszek 691 115 420, **Klaudia Zamkowska** 603 631 947,

Magdalena Cieślak-Włodarczyk 601 935 362.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl

» Stosować z podlewaniem w proporcji 0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody.

» Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.

» Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila COMPLEX oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.

» W przypadku przekropnej pogody i braku możliwości wykonywania nawożenia fertygacyjnego w okresie zwiększonego zapotrzebowania na potas (w czwartym tygodniu) zaleca się posypowe stosowanie saletry potasowo-wapniowej UNIKA CALCIUM w dawce 150 kg/ha.

© XII 2023

Produkuj ze smakiem!




Knowledge grows







dolistnie

posypowo

fertygacja

Kompleksowy program mineralnego nawożenia cebuli



YaraVita™				BRASSITREL PRO 3 l/ha	MANGAN F 1 l/ha	MIEDŹ 0,5 l/ha
YaraTera™					CALCINIT* 5 kg/ha + SUPERBA Mikromix 0,5 kg/ha	
YaraTera™			KRISTALON Zielony 3 kg/ha 2x co 10-14 dni			KRISTALON Pomarańczowy 3 kg/ha, 2x co 2 tyg.
KristaLeaf™			KristaLeaf FOTO** 3 kg/ha 2x co 10-14 dni			
Okres						
	przed siewem	2-3 tygodnie po wschodach	faza 4-5 liści właściwych	faza 6. liścia właściwego	faza 7. liścia właściwego	od początku grubienia cebuli załamanie szczypioru
YaraMila™	COMPLEX 500-600 kg/ha					
Unika™		UNIKA CALCIUM 150-200 kg/ha		UNIKA CALCIUM*** 150-200 kg/ha		

* w celu ograniczenia zasychania końcówek szczypioru.

** w celu regeneracji uszkodzeń herbicydowych oraz ograniczenia presji Stemphylium.

*** najpóźniej do połowy czerwca.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji.

Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami wędnięcia.