

YaraTera™

fertygacja jabłoni

przykład dla sadu owocującego
z obsadą ok. 2500 szt./ha,
odmiany późne na podkładce M9

Dawka nawozu na 1 ha/tydzień
podawana przez zbiornik:

	A	B	Osobny zbiornik
Początek kwitnienia			LEOTRAC 5 l/ha
Kolejny tydzień po pełni kwitnienia			
1. tydzień		Kristalon Żółty 25 kg	LEOTRAC 5 l/ha
2. tydzień	Calcinit 10 kg	Kristalon Żółty 15 kg	
3. tydzień	Calcinit 15 kg	Kristalon Żółty 15 kg	
4. tydzień (przełom maj/czerwiec)	Calcinit 30 kg		
5. tydzień	Calcinit 15 kg	Kristalon Niebieski 25 kg	
6. tydzień	Calcinit 15 kg	Kristalon Niebieski 25 kg	
7. tydzień	Calcinit 15 kg	Kristalon Niebieski 25 kg	
8. tydzień (przełom czerwiec/lipiec)	Calcinit 15 kg	Kristalon Niebieski 25 kg	
9. tydzień		Kristalon Biały 25 kg	
10. tydzień		Kristalon Biały 20 kg	
11. tydzień		Kristalon Biały 20 kg	
12. tydzień (przełom lipiec/sierpień)		Kristalon Biały 15 kg	
13. tydzień		Kristalon Biały 10 kg	
14. tydzień		Kristalon Biały 10 kg	

- » Wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).
- » Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.
- » Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila Complex oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.

Nawozy Yara do nawożenia jabłoni

YaraMila COMPLEX 12N+11P₂O₅+18K₂O+3MgO+20SO₃+mikro – bezchłorkowy, granulowany nawóz posypowy z aktywną formą fosforu, regenerującą system korzeniowy

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K₂O+12CaO – granulowana, posypowa saletra potasowo-wapniowa. Ułatwia dostosowanie nawożenia do spodziewanych plonów i przebiegu pogody

YaraLiva (granulowane posypowe saletry wapniowe wzmacniające naturalną odporność roślin, system korzeniowy oraz trwałość pozbiorną plonów)
NITRABOR 15,4N+25,6CaO+0,3B – posypowa saletra z borem
TROPICOTE 15,5N+26,3CaO – posypowa saletra wapniowa

YaraAmplix (specjalistyczne nawozy dolistne i biostymulatory)
OPTIVI biostymulator peptydowo-aminokwasowy do oprysków dolistnych oraz fertygacji. Wydłuża okres kwitnienia, polepsza żywotność zalążków i pyłku kwiatowego. Zwiększa pobieranie i wykorzystanie azotu, żelaza, wapnia
FLOSTREL 100g P₂O₅+100g B w 1 litrze + ekstrakt z alg morskich – płynny nawóz do oprysków dolistnych w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców, dostarczający energii, redukujący stresy abiotyczne, poprawiający jakość oraz wielkość plonu

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności działania)
LEOTRAC kwasy humusowe 15% w/w – płynny stymulator wzrostu zawierający kwasy humusowe do fertygacji, zwiększa pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby, stymuluje wzrost najmniejszych części korzeni
BORTRAC 150g B w 1 litrze – dolistny nawóz borowy
ZINTRAC 700 700g Zn w 1 litrze – dolistny nawóz cynkowy
FRUTREL 69g N+240g P₂O₅+280g CaO+98g MgO+40g Zn+20g B w 1 litrze – zawieszinowy nawóz z wysoką zawartością wapnia i fosforu, o przedłużonym działaniu, z dodatkiem koncentratu z alg morskich
STOPIT 224g CaO w 1 litrze – skoncentrowany nawóz wapniowy, zawierający chlorek wapnia w najczystszej chemicznej postaci

KristaLeaf (nawóz dolistny na trudne okresy wzrostu)
FOTO 14,2N+1,5P₂O₅+7K₂O+14MgO+27SO₃+1,5Fe(stabilny chelat)+ +0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem, regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)
CALCINIT 15,5N+26,5CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków; wzmacnia naturalną odporność roślin i system korzeniowy, poprawia jedrność i trwałość pozbiorną plonów

KRISTALON (seria nawozów do fertygacji lub dokarmiania dolistnego)
Zielony 18N+18P₂O₅+18K₂O+mikro
Żółty 13N+40P₂O₅+13K₂O+mikro
Pomarańczowy 6N+12P₂O₅+36K₂O+mikro
Niebieski 19N+6P₂O₅+20K₂O+mikro
Biały 15N+5P₂O₅+30K₂O+mikro

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz u przedstawicieli firmy: **Piotr Dutkowski** 695 331 511, **Sebastian Przedzienkowski** 695 111 945, **Agata Kawecka** 605 545 212, **Michał Wojcieszek** 691 115 420, **Klaudia Zamkowska** 603 631 947, **Magdalena Cieślak-Włodarczyk** 601 935 362.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl



Knowledge grows

Nawożenie i biostymulacja jabłoni

Posypowe
Dolistne
Fertygacja

© I 2026

Produkuj ze smakiem!




Knowledge grows

dolistnie

posypowo

fertygacja

Kompleksowy program mineralnego nawożenia i biostymulacji jabłoni



DOLISTNIE	YaraAmplix™		FLOSTREL 2 l/ha	FLOSTREL 2 l/ha + OPTIVI 3 l/ha	OPTIVI 3 l/ha					
	YaraVita™	ZINTRAC 700 1 l/ha			FRUTREL 3 l/ha 1-2x			STOPIT*** 10 l/ha 14 i 7 dni przed zbiorem		BORTRAC 2 l/ha + ZINTRAC 700 1 l/ha + KRISTALON Zielony 3 kg/ha
	YaraTera™					CALCINIT 5-10 kg/ha co 10-14 dni				
	YaraTera™						KRISTALON Pomarań- czowy***** 3 kg/ha 2x co 7-10 dni	KRISTALON Żółty 3 kg/ha; 4 i 2 tyg. przed zbiorem		
	KristaLeaf™					KristaLeaf FOTO 3 kg/ha 2x co 7 dni				
Okres										
		początek wegetacji	początek kwitnienia	koniec kwitnienia/ /po kwitnieniu	początek wzrostu zawiązków	faza orzecha włoskiego	dorastanie owoców	dojrzwianie owoców	dojrzałość zbiorcza i zbiór	po zbiorach
DOGLEBOWO	YaraMila™	COMPLEX 250 kg/ha*								
	Unika™			UNIKA CALCIUM lub NITRABOR** 200-250 kg/ha		UNIKA CALCIUM** 150 kg/ha				
	YaraLiva™	NITRABOR 150 kg/ha							NITRABOR**** 150 kg/ha	

* średnia dawka 100 g/drzewo, dawka 250 kg/ha odnosi się do obsady 2500 drzew/ha, wszystkie podane dawki nawozów posypowych stosujemy równomiernie w rzędy drzew na powierzchni pasów herbicydowych.

** UNIKA CALCIUM jest nawozem szczególnie przydatnym na glebach przepuszczalnych oraz dla odmian wykazujących wysokie zapotrzebowanie na potas; Nitrabor stosujemy na glebach lekkich, ubogich w bor. W przypadku wysokiej zasobności stanowiska w potas i bor stosujemy w tym terminie, zamiast tych nawozów, YaraLiva TROPICOTE, w takiej samej dawce.

*** zabiegi polecane w tym okresie zamiast CALCINITU dla odmian czerwono-owocowych, jak również w sytuacji przerastania owoców przy słabym zawiązaniu.

**** zabieg szczególnie wskazany przy obfitym zawiązaniu/owocowaniu w danym roku oraz w warunkach wymycia składników pokarmowych.

***** W przypadku odmian Gali i sportów dawki zwiększamy do 6 kg/ha.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji. Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami wędnięcia.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara.

Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.