

YaraTera™

fertygacja truskawki polowej

przykład dla plantacji z obsadą
około 33 000 szt./ha,
odmiany standardowe

Faza		Dawka nawozu na 1 ha/tydzień podawana przez zbiornik:	
		A	B
po ruszeniu wegetacji		CALCINIT 7,5 kg	KRISTALON Żółty 15 kg
przed kwitnieniem		CALCINIT 7,5 kg	KRISTALON Niebieski 15 kg
kwitnienie		KRISTA MAG 10 kg	KRISTALON Czerwony 20 kg
od zawiązywania owoców do dojrzewania		CALCINIT 10 kg	KRISTALON Pomarańczowy 15 kg
zbiór		CALCINIT 10 kg	KRISTALON Pomarańczowy 10 kg
po zbiorach			KRISTALON Niebieski 15 kg

- » Wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).
- » Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.
- » Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila COMPLEX oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.

Nawozy Yara do nawożenia truskawki

YaraMila COMPLEX 12N+11P₂O₅+18K₂O+3MgO+20SO₃+mikro – bezchlorkowy, granulowany nawóz posypowy z aktywną formą fosforu, regenerującą system korzeniowy.

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K₂O+12CaO – granulowana, posypowa saletra potasowo-wapniowa. Ułatwia dostosowanie nawożenia do spodziewanych plonów i przebiegu pogody

YaraLiva (granulowane posypowe saletry wapniowe wzmacniające naturalną odporność roślin, system korzeniowy oraz trwałość pozbiorniczą plonów)

NITRABOR 15,4N+25,6CaO+0,3B – posypowa saletra z borem

TROPICOTE 15,5N+26,3CaO – posypowa saletra wapniowa

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności działania)

ACTISIL 0,6Si (stabilizowany choliną) + 2Ca – preparat krzemowy poprawiający plonowanie i jakość owoców

FRUTREL 69 g N + 240 g P₂O₅ + 280 g CaO + 98 g MgO + 40 g Zn + 20 g B w 1 litrze – zawiesziny nawóz z wysoką zawartością wapnia i fosforu, o przedłużonym działaniu,

z dodatkiem koncentratu z alg morskich

STOPIT 224 g CaO w 1 litrze – skoncentrowany nawóz wapniowy, zawierający chlorek wapnia w najczystszej chemicznej postaci

KristaLeaf (seria nawozów dolistnych na trudne okresy wzrostu)

FOTO 14,2N+1,5P₂O₅+7K₂O+14MgO+27SO₃+1,5Fe (stabilny chelat) +0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem, regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)

CALCINIT 15,5N+26,5CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków; wzmacnia naturalną odporność roślin i system korzeniowy, poprawia jędrność i trwałość pozbiorniczą plonów

KRISTALON (seria nawozów do fertygacji lub dokarmiania dolistnego)

Żółty 13N+40P₂O₅+13K₂O+mikro

Pomarańczowy 6N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Niebieski 19N+6P₂O₅+20K₂O+mikro

Czerwony 12N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz u przedstawicieli firmy: **Wojciech Kopeć** 695 331 511,

Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, **Hubert Tabor** 605 545 212,

Michał Wojcieszek 691 115 420, **Wojciech Wojcieszek** 601 935 362,

Klaudia Zamkowska 603 631 947.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl



Knowledge grows

Nawożenie truskawki

Posypowe

Dolistne

Fertygacja

© VIII 2023

Produkuj ze smakiem!



Knowledge grows

dolistnie

posypowo

fertygacja

Kompleksowy program mineralnego nawożenia truskawki polowej



YaraVita™	DOLISTNIE		FRUTREL 3 l/ha	ACTISIL 1 l/ha 2x co 5-7 dni	STOPIT* 5 l/ha		
YaraTera™					CALCINIT 5 kg/ha co 7-10 dni		
YaraTera™					KRISTALON Pomarańczowy 3 kg/ha; co 7-10 dni, na przemian z Calcinitem		
KristaLeaf™			KristaLeaf FOTO 3 kg/ha			KristaLeaf FOTO 3 kg/ha 3x co 7-10 dni	
Okres							
		po ruszeniu wegetacji	przed kwitnieniem	kwitnienie	od zawiązywania owoców do dojrzewania	zbiór	po zbiorach
YaraMila™	DOGLEBOWO	COMPLEX 150-200 kg/ha					COMPLEX 250 kg/ha
Unika™				UNIKA CALCIUM 150 kg/ha			
YaraLiva™			NITRABOR 150 kg/ha				

* stosujemy zamiast CALCINITU przy bardzo wysokiej zasobności gleby w azot oraz w warunkach jej wysokiej wilgotności.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji. Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami wędnięcia.