



Knowledge grows

Stosowanie YaraVita CYNK F w uprawach sadowniczych

- » **jabłoń:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **grusza:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **czereśnia:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **śliwa:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **wiśnia:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **brzoskwinia:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **morela:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **porzeczką:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach;
- » **borówka amerykańska:** dawka 1 l/ha, po pęknięciu pąków oraz około 7 dni po zbiorach.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz u przedstawicieli firmy: **Piotr Dutkowski** 695 331 511, **Sebastian Przedzienkowski** 695 111 945, **Agata Kawecka** 605 545 212, **Michał Wojcieszek** 691 115 420, **Klaudia Zamkowska** 603 631 947, **Magdalena Cieślak-Włodarczyk** 601 935 362.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Młczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl

© I 2025



Knowledge grows

YaraVita™ CYNK F w uprawach sadowniczych

Zawieszinowy nawóz dolistny opracowany specjalnie do stosowania wiosną i jesienią w celu wzmocnienia odporności roślin na niskie temperatury

- koncentracja cynku w nawozie nawet do 10 razy wyższa w porównaniu do nawozów standardowych;
- długotrwale, równomiernie i skutecznie zaopatruje rośliny w cynk po zastosowaniu;
- sprzyja zwiększeniu odporności pąków kwiatowych na działanie niskiej temperatury;
- dodatek substancji wspomagających wydatnie poprawia skuteczność działania, również po opadach atmosferycznych.



...i spokojniej
wiosną...

700 g Zn
w 1 litrze



Cynk spełnia wiele funkcji w roślinie, a jedną z nich jest utrzymanie integralności membran komórkowych oraz wpływ na wysycenie ich nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Im wysycenie wspomnianymi kwasami większe, tym stabilność oraz odporność błon komórkowych na przechłodzenie komórek są wyższe. **Inaczej mówiąc, przy dobrym zaopatrzeniu roślin w cynk, ich uszkodzenia na skutek przechłodzenia są mniejsze.**

Właściwości nawozu YaraVita CYNK F **umożliwiają** (po zabiegu wykonanym na początku wegetacji, po pęknięciu pąków) **równomierne dostarczanie cynku nie tylko zaraz po oprysku, ale także w czasie kwitnienia.**

Jak potwierdzają badania, **jesienne stosowanie YaraVita CYNK F, wpływa również na znaczne zwiększenie zawartości cynku w tkankach roślinnych w kolejnym sezonie.**

Takie działanie YaraVita CYNK F jest możliwe dzięki specjalnym substancjom wspomagającym, które mają na celu ułatwienie aplikacji oraz poprawę skuteczności. Są to:

- » **środki zwilżające, obniżające napięcie**, poprawiające pokrycie roślin cieczą roboczą, co zwiększa powierzchnię absorpcyjną i zapobiega przypaleniom;
- » **substancje zwiększające przyczepność**, zapewniające odporność na zmywanie przez deszcz;

- » **absorbenty**, substancje poprawiające pobieranie składników przez roślinę;
- » **dyspersanty i emulgatory**, poprawiające równomierne rozłożenie składników pokarmowych w cieczy roboczej oraz ich pobieranie przez rośliny;

YaraVita CYNK F wykazuje się dobrą mieszalnością ze środkami ochrony roślin. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Tankmix.com.



Tankmix

Tankmix.com to strona firmy Yara, która dostarcza informacji na temat możliwości mieszania nawozów YaraVita ze środkami ochrony roślin.

Aby skorzystać z wyszukiwarki mieszanin zbiornikowych, należy wejść na stronę tankmix.com lub po prostu zeskanować zamieszczony kod QR.